


# الصدرن



# ما هو الدرن؟

مرض بكتيري معدٍ يهاجم الرئتين وقد  
يصيب أجزاء أخرى من الجسم

ويعرف أيضًا بـ السُّل



# ما هو الدرن؟

مرض معدٍ يُصاب به الشخص نتيجة العدوى  
ببكتيريا تسمى "المايكوبكتيريوم" والتي  
تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى  
بالجسم، ويعرف أيضًا بالسُّل



# كيف ينتقل؟

تنتشر البكتيريا عبر الهواء عن طريق سعال أو عطاس المصاب حيث يمكن إلتقاط العدوى عن طريق التنفس كما ينتشر بسهولة أكبر في الأماكن المغلقة لفترة طويلة من الزمن



# ما هي أنواع الإصابة؟

## السُّلُّ النشط

البكتيريا نشطة وتنمو في الجسم



يوجد أعراض



ينقل العدوى للآخرين إذا كان في الرئة أو الحنجرة



يؤدي للوفاة إذا لم يتم معالجته



## السُّلُّ الكامن

لا ينقل العدوى للآخرين



البكتيريا خاملة



يتطور ليكون نشط



لا يوجد أعراض



يمكن معالجته والوقاية منه



# من هم الأكثر عرضة للإصابة به؟

المخالطين لحالات الدرن الرئوي  
أو درن الحنجرة



المصابين بأمراض مزمنة  
والمرضى المصابين بنقص المناعة



المدخنين ومتعاطي الكحول



حالات الدرن الكامن



# ما هي أعراض الإصابة به؟

كحة مستمرة لأكثر من أسبوعين



ضيق في التنفس مع ألم في الصدر



حمى



تعرق في الليل



ضعف عام



فقدان الوزن



كما يمكن للسُل أن يصيب أي عضو في الجسم  
(سُل خارج الرئة)

# كيف يتم الفحص عن الدرن؟

## فحص الدرن النشط

فحص القشع  
(البلغم)




علامات وأعراض  
الدرن



أخذ عينة دم لمزرعة  
وفحص جيني سريع



الأشعة السينية  
للمصدر



## فحص الدرن الكامن

فحص الدم



فحص جلدي



## التشخيص المبكر يمنع

حدوث مضاعفات



انتشار العدوى



مقاومة الأدوية



تطور المرض




# كيف تتم معالجته؟

مجموعة من المضادات البكتيرية  
مدة علاج: الدرر الرئوي الغير مقاوم للأدوية  
6 أشهر

عدم الالتزام بأخذ العلاج في المدة  
المحددة يتسبب في:

- مقاومة البكتيريا للدواء 
- الإصابة من جديد 
- طول مدة العلاج 

لتصبح مدة العلاج: 9 - 20 شهر



# مقاومة الدرن للأدوية!

هو قدرة البكتيريا على مقاومة الأدوية  
المستخدمة لعلاج الدرن مما يؤدي إلى الحد  
أو إيقاف فعالية الأدوية المستخدمة.

وتحدث هذه المقاومة بسبب عدم  
الانتظام في تناول أدوية الدرن أو إيقاف  
استخدامها قبل انتهاء المدة المدة للعلاج



# إذا توقفت عن تناول الأدوية مبكرًا أو كنت لا تتناولها بالطريقة الصحيحة

1 يمكن أن تعود لك الأعراض مرة أخرى  
وتبقى مريضًا لفترة أطول.

2 يمكن أن تتوقف الأدوية عن مفعولها  
وقد تضطر إلى تناول أدوية مختلفة  
لها آثار جانبية أكثر.

3 قد تزيد مقاومة البكتيريا وحتى  
الأدوية الجديدة قد لا تعمل في علاج  
مرض الدرن

4 يمكن أن تنقل العدوى للآخرين

# كيف يمكن الوقاية منه؟

أخذ لقاح الدرن (BCG) بعمر 6 أشهر



تجنب زيارة الدول الموبوءة



لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار  
عند مخالطة المصاب أو عند الإصابة



الالتزام بأخذ الدواء في حالات  
الدرن الكامن



الالتزام بأخذ وإكمال العلاج  
في حالات الدرن النشط

